

Informationen zur Impfstoffbestellung in der Woche vom 20. September bis 24. September 2021 (KW 38)

Stand: 3. September 2021

Deutschlandweite Aktionswoche #HierWirdGeimpft vom 13. bis 19. September 2021

Gerne weisen wir erneut auf die deutschlandweite Aktionswoche vom 13. bis 19. September 2021 unter dem Motto: #HierWirdGeimpft hin. Alle Impfangebote, die in diesem Zeitraum stattfinden, sollen unter dem gemeinsamen Hashtag und mit intensiver Begleitkommunikation beworben werden. Alle Informationen sowie Materialien zur Aktion finden Sie unter www.hierwirdgeimpft.de.

Für die Aktion wird der Impfstoff Comirnaty® von BioNTech/Pfizer sowie der Impfstoff COVID-19 Vaccine Janssen® von Johnson & Johnson für die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bereitgestellt. Bestellungen des Impfstoffs für die Aktionswoche konnten bereits mit der „normalen“ Bestellung bis zum 1. September 2021 in der Bezugsapotheke abgegeben werden.

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wird dem Großhandel ein Sonderkontingent an Impfstoffen für die Impfwache bereitstellen. Dadurch ist es möglich, dass Betriebsärzte kurzfristig Dosen nachbestellen können, sollte der regulär geordnete Impfstoff nicht ausreichen. Nachbestellungen werden mit einer Vorlaufzeit von drei Werktagen durch die Apotheken an die bestellenden Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ausgeliefert. Die Rezepte für die kurzfristige Nachbestellung müssen mit dem Zusatz „Aktionswoche Impfen“ gekennzeichnet werden.

Impfstoff für Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen

Die Betriebsärzte erhalten in der Woche vom 20. September bis 24. September 2021 (KW 38) den Impfstoff Comirnaty® von BioNTech/Pfizer.

Es wird erneut keine Höchstbestellmengen geben. Das heißt: Die Betriebsärzte geben auf dem Rezept an, wie viele Dosen sie für die von ihnen durchgeführten Impfungen benötigen.

Die Bestellungen des Impfstoffs erfolgen über das blaue Privatrezept. Die Verwendung separater Rezepte ist NICHT mehr erforderlich. Die Bestellungen für Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen (Drittimpfungen) erfolgen gemeinsam und ohne besondere Kennzeichnung auf einem Rezept.

Über die tatsächliche Liefermenge gibt die Apotheke dem Betriebsarzt spätestens am Mittwoch, 15. September 2021, eine Rückmeldung.



Hinweise:

Bitte bestellen Sie nur die Impfstoffmengen, die Sie sicher verimpfen können. Grundsätzlich hat der bestellende Betriebsarzt dafür Sorge zu tragen, dass keine Lagerhaltung erfolgt. Verwurf von Impfstoff ist unbedingt zu vermeiden.

Bitte geben Sie die Anzahl der Dosen entsprechend der Vial-Größe an: Wenn Sie also beispielsweise 23 Patienten mit dem Impfstoff Comirnaty® von BioNTech/Pfizer impfen wollen, geben Sie 24 Dosen (4 Vials mit 6 Dosen) an.

Weitere Informationen / Ankündigung

Gerne möchten wir bereits heute folgendes vorab ankündigen:

- Das Bestellfenster für die Impfstoffbestellungen wird ab dem 21. September 2021 vereinheitlicht und für die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte von Donnerstag auf Dienstag vorverlegt. Das heißt, dass Impfstoffbestellungen für die Woche vom 4. bis 8. Oktober 2021 (KW 40) bereits bis zum Dienstag, 21. September 2021, 12.00 Uhr, erfolgen müssen.
- Ab der Woche vom 4. Oktober bis 8. Oktober 2021 (KW 40) erhalten die Betriebsärzte auf Wunsch neben dem Impfstoff Comirnaty® von BioNTech/Pfizer auch den Impfstoff Spikevax® von Moderna. Informationen zu diesem Impfstoff finden Sie sowohl nachfolgend als auch in der Handreichung Betriebsärzte zu Impfstoffen und Zubehör. Die Handreichung können Sie hier herunterladen: <https://tinyurl.com/2p7tupbd>.

Lagerung und Haltbarkeit des Impfstoffs Spikevax® von Moderna

- Aufgetaute und ungeöffnete Durchstechflaschen: Für maximal 30 Tage im Kühlschrank vor Licht geschützt bei 2 °C bis 8 °C. Nach Entnahme aus der Kühlung kann der ungeöffnete Impfstoff bis zu 12 Stunden bei 8 bis 25 °C aufbewahrt werden.
- Nach dem Auftauen darf der Impfstoff nicht erneut eingefroren werden.
- Der Impfstoff ist vor Erschütterungen und Licht zu schützen.
- Geöffnete Durchstechflasche: Die chemische und physikalische Stabilität während der Anwendung ist nach dem erstmaligen Durchstechen des Stopfens über 19 Stunden bei 2 bis 25 °C belegt. Aus mikrobiologischer Sicht sollte das Produkt sofort verwendet werden.

Vorbereitung und Verabreichung des Impfstoffs Spikevax® von Moderna

- Website des Herstellers: <https://modernacovid19global.com/de-DE?>

Impfschema für den Impfstoff Spikevax® von Moderna

- 2 Dosen intramuskulär
- Nach der 9. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung der STIKO soll die zweite Dosis vier bis sechs Wochen nach der ersten Dosis verabreicht werden



Ansprechpartner:

BDA | DIE ARBEITGEBER

Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände

Soziale Sicherung

T +49 30 2033-1600

soziale.sicherung@arbeitgeber.de

Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit rund 20 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden verbunden.